

四庫全書

子部

欽定四庫全書

子部

世醫得效方卷二

詳校官太醫院醫士臣針砭

編修臣倉聖脈攸勘

總校官降調編修臣倉聖脉

校對官中書臣李斯咏

騰錄監生臣張仲芳

欽定四庫全書

世醫得效方卷二

元 危亦林 撰

大方脈雜醫科

傷風

桂枝湯治足太陽膀胱經傷風脈陽浮而陰弱陽浮者
熱自發陰弱者汗自出漉漉惡寒洒洒惡風翕翕然發
熱鼻鳴乾嘔又太陽證宜汗其人失血及下利則頻與

服使體潤熱熱連日當自解

桂枝

去皮

芍藥

各三兩

甘草

一兩

右剉散每服二錢水一盞半生薑三片棗一枚擘破
共煎至七分去滓溫服不拘時惟冬春初可行自春
及夏至以前可加黃芩半兩夏至以後加知母半兩
石膏二兩或升麻半兩若病人素虛寒者不用加減
無汗者不宜服之

杏子湯治足陽明胃經傷風惡食口苦咽乾腹滿微喘

發熱惡風自汗嗜臥身重小便難潮熱而噦其脈浮弦
長而數悉主之

杏仁

去皮尖

半夏

湯去滑

五味子

各三錢半

芍藥

桂心

細辛

乾薑

大黃

蒸

甘草

炙各三錢

茯苓

四錢

右剉散每服四錢水一盞半煎至七分去滓食前服
柴胡加桂湯治足少陽膽經傷風四五日身熱惡風頸
項強脇下滿手足溫口苦而渴自汗其脈陽浮陰弦或

發汗多亡陽譫語可以此和其榮衛通其津液自愈

柴胡

一兩三錢

半夏

湯去滑四錢一字

甘草

炙一錢一字

芍藥

黃芩

人參

棘桂

各半兩

右剉散每服五錢水一盞半薑五片棗一枚煎至七分去滓空心溫服

桂枝芍藥湯治足太陰脾經傷風自汗咽乾腹滿自利不渴四肢倦怠手足自溫其脈弦大而緩者

桂心

半兩

白芍藥

三兩

右挫散每服五錢鹽水一盞半薑五片棗一枚煎七分去滓溫服腹痛甚者加大黃一兩

桂附湯治足少陰腎經傷風胸滿心煩咽喉痛自汗腰疼連肝骨酸痛嘔吐涎沫頭痛其脈沈弦者

附子

生去皮臍

桂心

乾薑

芍藥

甘草

炙

茯苓

桃仁

去皮尖麩炒各一兩

右剉散每服四錢水二盞煎七分去滓食前服或咽喉痛加桔梗半兩

八物湯治足厥陰肝經傷風惡風而勸自汗小腹急痛
寒熱如瘧骨節煩疼其脈尺寸俱微而遲者

桂心

當歸

川芎

前胡

防風

各三分

芍藥

一兩半

甘草

炙

茯苓

各半兩

右剉散每服四錢水一盞半薑五片棗三枚煎至八
分去滓空心服

傷暑

五苓散治傷暑煩渴引飲無度兼治傷風溫熱表裏未

解煩渴引水水入即吐或小便不利及汗出表解煩渴
不止又治霍亂吐利黃疸瘟疫

澤瀉

二兩半

桂心

一兩

猪苓

去皮

赤茯苓

去皮

白朮

去蘆各一兩半

右為末每服二錢沸湯調下不拘時候服訖多飲熱
湯汗出即愈溫熱病加甘草一兩炙瘥熱在裏身發
黃疸濃煎茵陳湯食前服疸病發渴及中暑引飲白
水調服小兒加白朮末少許發虛熱每料綿黃芪人

參麥門冬去心各一兩分陰陽退實熱山茵陳車前
草每服各二根止瀉加紫蘇陳米各少許薑汁半匕
久痢加肉豆蔻五錢每服鹽梅一枚赤痢烏梅一枚
粟殼二枚去蒂赤膜醋炒白痢粟殼二枚製同上粟米一
撮腹痛南木香半錢渴烏梅一箇枇杷葉二片去白
毛糯米一撮伏暑鼻衄白茅花一把小便血以生料
者每服加梔子三箇車前子一撮煩熱心神恍惚朱
砂一字燈心二十草麥門冬二十粒去心淡竹葉十

片車前草二根傷暑吐血白茅花一握熱瀉車前子
一撮麥門冬二十粒去心暑濕瀉紫蘇五葉木瓜三
片車前子一撮傷暑頭痛濃煎葱白湯大便秘水瀉小
便不利加真車前子末少許又方治燥渴去桂心加
人參謂之春澤湯濕瀉身痛加蒼朮少許秋多淫雨
人患濕疫在冬時服之效

縮脾飲治伏暑熱煩渴燥悶乾霍亂

草果

去皮

縮砂

烏梅

去核
各一兩

乾葛

白扁豆

生薑

切片日乾各五錢重

右剉散每服五錢水一盞煎至八分浸冷服或欲溫
欲熱亦可斟酌傷暑發熱頭目痛用以吞消暑丸方
見後中暑類

卻暑散治冒暑伏熱頭目眩暈嘔吐瀉利煩渴背寒面
垢

赤茯苓

去皮

甘草

生各四兩

寒食麴

生薑

各一片細切搜麴令勻

右為末每服二錢新汲水調下或湯點服不拘時候
香薷丸治大人小兒傷暑伏熱燥渴脅悶頭目昏眩胸
膈煩滿嘔噦惡心口苦咽乾肢體困倦不思飲食或發
霍亂吐利轉筋並宜服之

香薷

去梗

紫蘇

去梗

乾木瓜

各一兩

丁香

甘草

炙

檀香

白茯苓

去皮

藿香

各十兩

右為末蜜丸彈子大每一丸至二丸熟水嚼下或新
汲水化下亦得小兒半丸

桂苓甘露散治傷寒中暑冒風飲食中外一切所傷傳受濕熱內甚頭痛口乾吐瀉煩渴喜飲冷小便赤澀大便急痛濕熱霍亂吐下腹滿痛悶及小兒吐瀉驚風

茯苓

去皮 一兩

甘草

炙 二兩

白朮

半兩

澤瀉

一兩

桂

半兩
去皮

石膏

二兩

寒水石

二兩

滑石

半兩

猪苓

半兩

右為末每服三錢溫湯調下新水亦得生薑湯尤良
小兒每服一錢

六和湯治心脾不調氣不升降霍亂轉筋嘔吐泄瀉寒熱交作痰喘咳嗽胸膈痞滿頭目昏痛肢體浮腫嗜臥倦怠小便赤澀并傷寒陰陽不分冒暑伏熱煩悶或成痢疾中酒煩渴不食婦人胎前產後並宜服之

人參

縮砂

甘草

炙

杏仁

去皮尖

半夏

湯炮七次各三兩

白扁豆

薑汁略炒

赤茯苓

去皮

藿香葉

拂去塵

木瓜

各二兩

香薷

去梗

厚朴

薑汁各四兩

右剉每服四錢水一盞半生薑三片棗子一枚煎至

八分去滓不拘時候服

冷香飲子老人虛人伏暑煩燥引飲無度惡人疲倦服
涼藥不得者

草果仁

三兩

附子

炮去皮臍

橘紅

各一兩

甘草

炙半兩

右剉散每服一盞水二盞生薑十片煎半盞去滓沈
冷旋旋服不拘時

潑火散傷暑煩燥發渴口乾及治血痢婦人熱崩

青皮

去白

赤芍藥

黃連

去鬚

地榆

各等分

右為細末每服一錢冷水調下如蓄熱而氣血妄行
加甘草等分

枇杷葉散治中暑伏熱煩渴引飲嘔噦惡心頭目昏眩
或陰陽不和致成霍亂吐利轉筋煩燥

枇杷葉

去毛炙半兩

香薷

三兩

白茅根

甘草

炙

麥門冬

去心

乾木瓜

各一兩

陳皮

去白焙半兩

丁香

厚朴

去皮薑汁炙各半兩

右剉散每服五錢水一盞半生薑三片煎服煩燥沈

冷服如脾虛感暑嘔吐不食以此藥煎去滓吞消暑
丸六十粒立効體本虛嘔吐昏倦手足冷除茅根麥
門冬加附子炮用

香薷散治臟腑冷熱不調飲食不節或食腥膻生冷過
度起居不節或露臥濕地或當風取涼而風冷之氣歸
於三焦傳於脾胃脾胃得冷不能消化米穀致令真邪
相干腸胃虛弱飲食變亂於腸胃之間致吐利心腹疼
痛霍亂氣逆有心痛而先吐者有腹痛而先利者有吐

利俱發者有發熱頭痛體疼而復利吐虛煩者或但吐
利心腹刺痛者或轉筋拘急疼痛或但嘔而無物出者
或四肢逆冷而脈欲絕或煩悶昏塞而欲死者此藥悉
能主之

香薷

去梗
四兩

厚朴

去麁皮切碎
薑汁炒令黃

白扁豆

各二
兩

右剉散每服五錢水一盞酒一分同煎七分去滓水
中沈冷連喫二服立效不拘時候治中暑復傷風擗
搦不省人事者宜先服蘇合香丸候其甦省却以此

藥加黃連羌活各一錢暑濕腫滿香蘇散合和加生
薑三片木瓜二片車前草二根伏暑頭疼小便澀濁
加山茵陳車前草各二根霍亂吐利加木瓜二片藿
香少許生薑三片傷暑腹痛加陳大蓼三寸陳壁土
一指頭大木瓜二片臟腑有熱便血加黃連厚朴枳殼
烏梅各一錢小便血加瞿麥穗一錢車前子一撮燈
心二十莖感暑濕手足繃痛痺冷合和香蘇散每服
四錢薑三片木瓜二片陳大蓼三寸煎服留滓再加

蔥葉橘葉竹葉陳大蓼各一握水一斗煮七分先薑
後洗立效脚氣作痛行步艱辛每料加入木瓜羌活
炒蒼朮枳殼去穰陳皮半夏甘草各一兩成十味每
服加生薑三片葱白二根脾胃不和嘔逆惡心冒暑
心腹脹滿去羌活加藿香烏梅各一錢壯熱大渴肚
皮熱或五心熱加燈心二十莖麥門冬去心白茅根
各一錢淡竹葉十片晚禾根淨洗一握四時感冒嘔
泄亦合和香薷散每服四錢加生薑五片木瓜二片

諸熱毒小便赤濁每服四錢加車前子黃連去鬚各一錢則清利以上皆溫服暑月煩燥潮熱甚加茵陳車前草各二莖苦竹葉十片山梔子三枚擘破心胸煩燥只依本方宜清前血冷服暑月潮瀉亦加烏梅車前子一錢陳米一撮暑月虛人腹痛嘔血加丁香白朮炮附子木瓜各半錢生薑五片亦名六和湯解暑和脾胃加人參陳皮白朮白茯苓黃芪木瓜甘草每料各一兩亦名十味香薷散傷暑單有頭痛正方

加山茵陳多服取效以上並熱服常服消暑健脾或

為末煉蜜為膏酒服亦妙

陳大蓼須用家園種者江邊赤蓼則不用

小黃龍湯治伏暑發熱作渴嘔吐惡心及年深暑毒不差

黃連

一斤去鬚

酒

二升半

右將黃連以酒煮乾為度焙為末用麴糊丸如梧子大每服三十丸熟水吞下又治傷酒過度臟毒下血或泄瀉米飲下食前日二服酒及熱物過度吐血茅

花湯下

來復丹治上盛下虛裏寒外熱伏暑泄瀉如水及治中

暑

方見後痼冷類

小柴胡湯治傷暑外熱內渴於內更加生薑三片烏梅

一箇麥門冬三十粒去心煎服不拘時候

方見前傷寒陽證類

竹葉石膏湯治伏暑內外熱熾煩燥大渴

方見前傷寒通治類

二陳湯治傷暑復感冷及內傷生冷嘔吐

方見前飲類

濯執散治傷暑迷昏及泄瀉霍亂作渴立效亦能解諸

毒

白礬

五倍子

烏梅

去核

甘草

各一兩

右為末入飛羅麪四兩拌勻每服二錢新汲水調下
雖平日不敢飲冷者服之不妨真有奇效為丸如彈
大陰乾冷水調下亦可

通苓散治傷暑潮熱煩渴小便不利

方見後
泄瀉類

每服三錢水一盞半燈心二十莖麥門冬二十粒去
心淡竹葉十片車前穗五莖煎不拘時候服渴甚晚

木根少許白茅根五莖枇杷葉二皮去白毛蜜塗微
灸煎服

傷濕

香蘇散加蒼朮川芎白芷木瓜對合各用四錢生薑三
片煎服日近遠年傷濕倦弱如虛損多服取効

方見前
傷寒和

類解

黃耆建中湯治傷濕鼻塞身痛

黃耆

微炙

辣桂

各二兩

甘草

炙二兩

白芍藥

六兩

右挫散每服三錢薑四片棗一枚煎食前服

不換金正氣散治傷濕益脾順氣加茯苓一兩生薑每

服三片

方見後時疫類

朮附湯治傷濕大小便自利

方見後中濕類

茵陳湯治濕氣瘀熱發黃小便秘澀渴引水漿

茵陳

一兩半

大黃

半兩

小紅梔子

十枚

右挫散每服三錢水煎服

腎著湯治身重腰冷痺如坐水中形如水狀及不渴小

便自利飲食如故病屬下焦從身勞汗出衣裏冷濕而得之腰以下冷痛腰重如帶五千錢

甘草

炙

白朮

各二兩
去蘆

乾薑

炮

茯苓

各四兩
去皮

右剉散每服四大錢水一盞半煎十分去渣食前服
滲濕湯治坐臥濕地或為雨露所襲身重脚弱關節重
疼發熱惡寒或小便秘澀大便飧泄或汗出衣裏濕漬
得之腿膝或腫小便利反不渴

蒼朮

米泔
浸

白朮

去蘆

甘草

炙各
二兩

乾薑

炮

茯苓

各四兩

陳皮

丁香

各半兩

右剉散每服四錢用水一盞半生薑三片紅棗一枚

煎至七分去渣溫服或腹膨腰脚重滯

青木香丸熟水下兼服方

見諸
症類

瓜蒂搐鼻法治傷濕鼻塞頭疼瓜蒂不以多少吹咀為細末口含水搐一字許入鼻中流出黃水即效

中寒

附子理中湯治五臟中寒口噤四肢強直失音不語

大附子

炮去皮臍

人參

乾薑

炮

甘草

炙

白朮

各等分

右為劉散每服四大錢水一盞半煎七分去渣不以時服口噤則幹開灌之

薑附湯治中寒卒然暈倒或吐逆涎沫狀如暗風手脚攣搐口噤四肢厥冷或復燥熱

乾薑

炮

附子

炮去皮臍各一兩

右為劉散每服四錢水盞半煎七分去渣食前服入

肝加木瓜入肺加桑白皮入脾加白朮入心加茯苓
隨證加之挾風加防風兼濕多加白朮筋脈牽急加
木瓜肢節疼痛加桂心人參白朮各等分仍須暖室
添衣被火等圍護

中暑

又名中暈

大黃龍丸治中暑眩暈不知人身熱惡寒頭疼狀如傷
寒或往來寒熱煩燥渴甚嘔吐泄瀉常服去暑毒分陰
陽

硫黃

消石

各一兩

雄黃

通明者

滑石

白礬

寒食麴

四兩

石為末滴水為丸如梧桐子大每服五丸至七丸漸加至二十丸新汲水下昏塞不知人事以水化開灌之中暑忌得冷此藥却以冷水下之乃熱因寒用疑者釋之

益元散治中暑身熱嘔吐熱瀉赤痢癰閉溢痛利小便益精氣通九竅六府消畜水止渴除煩熱心燥百藥酒

食等毒解疫癘及兩感傷寒及婦人下乳催生兼吹乳
乳癰孕婦莫服

白滑石 六兩 甘草 一兩炙

右為極細末每服三錢蜜少許溫水調下無蜜亦得
日三服欲冷新汲水調下發汗煎葱白豆豉湯并三
四服此藥解散暑熱多服無害有益

消暑丸治中暑煩渴暈眩寒熱煩燥悶亂或似欲絕者

半夏 一斤湯洗
七次去滑

茯苓 去皮

甘草 生各
半斤

右為末薑汁麴糊為丸如梧桐子大每服三十九新
汲水下中暑為患藥下即甦夏中常服止渴利小便
若痰飲停滯中脘不快頭眩喜嘔薑湯吞下
正名生
料消暑
丸

皂莢湯治中暑不省人事

猪牙皂莢

一兩
燒灰

甘草

一兩
微炒

右為細末每服二錢溫熱水調下

來復丹

方見後痢冷類

治中暑昏迷霍亂吐瀉每服五

原缺

白朮

半兩去蘆

苦酒三盞煎一盞頓服不能飲酒以水代日三服夜

一服

甘草附子湯治中濕小便不利大便自利

附子

炮一箇七錢淨者

甘草

炙各一兩

辣桂

去麋皮二兩

右剉散每服三錢水一盞半薑七片煎食前微溫服汗出加防風悸氣加茯苓各二錢

四氣兼中

附子湯治五臟中風寒手足不仁口面喎斜昏暈失音眼目潤動牙車緊閉不得轉動

附子

泡去皮臍

桂心

各半兩

細辛

去苗

防風

去叉

人參

去蘆

乾薑

炮各六錢

右剉散每服四錢水一盞半薑五片棗一枚煎七分食前服或為末酒調二錢服

防風湯治中風挾暑卒然暈倒面青黑四肢緩弱喜伸欠口喎斜四肢不仁好笑

防風

去叉

澤瀉

桂心

杏仁

麴炒去皮尖

乾薑

炮

甘草

炙各等分

右剉散每服四錢水一盞半煎七分食前服

生附白朮湯治中風濕昏悶恍惚脹滿身重手足緩縱
熱熱自汗失音不語便利不禁

附子

生去
皮臍

乾薑

各半兩

白朮 一兩

甘草

炙
一兩

右剉散每服四錢水一盞半煎七分食前服

附子麻黃湯治寒濕所中昏暈緩弱或腰背強急口喎

斜語音混濁心腹脹氣上喘不能動轉

附子

炮去皮臍

麻黃

去節湯洗

白朮

去蘆

乾薑

甘草

炙

人參

各等分

右剉散每服四錢水一盞半煎七分食前服

苓朮湯治冒暑遭雨暑濕鬱發四肢不仁半身不遂骨節離解緩弱不收或入浴暈倒口眼喎斜手足彈曳皆濕溫類也

附子

炮去皮臍

茯苓

白朮

乾薑

炮

澤瀉

桂心

各等分

右判散每服四錢水一盞半煎七分食前服

四氣相感

麻黃白朮湯治寒濕身體煩疼無汗惡寒發熱者

麻黃

去節
三兩

桂心

二兩

甘草

炙
一兩

杏仁

二十粒
去皮尖

白朮

四兩
去蘆

右判散每服四錢水一盞半煎七分食前溫服

桂枝附子湯治風濕相搏身體煩疼掣痛不得屈伸汗出短氣小便不利惡風不欲去衣或身微腫

桂枝

去皮
四兩

白朮

去蘆

附子

炮去皮臍
各三兩

甘草

炙
二兩

右剉散每服四錢水一盞半薑五片棗二枚煎七分空心溫服或大便秘則去桂小便不利悸氣加茯苓三兩痺加防己四兩腹痛加芍藥四兩

防己黃耆湯治陽風濕寒脈浮緊細身重汗出惡風并治風水脈浮身重不渴

防己

四兩

黃耆

四兩
去蘆

甘草

炙
二兩

白朮

三兩
去蘆

右劉散每服五錢水盞半薑五片棗二枚煎七分去滓空心服喘者加麻黃一兩胃中不和加芍藥二兩氣上衝加桂一兩有陳寒加細辛一兩服後當如蟲行皮中從腰下如水後坐被上又以被遶腰以溫下微汗瘥

白朮茯苓乾薑湯治伏暑中風濕煩渴引飲心腹疼痛悶口乾面垢洒洒惡寒淅淅惡風微汗饑不能食者

白朮

去蘆

乾薑

茯苓

細辛

桂心

乾葛

甘草炙

橘皮

烏梅

豆豉

右等分為末每服二錢白湯點下

茯苓白朮湯冒暑毒加以著濕或汗未乾即浴皆成暑

濕

茯苓

乾薑炮

甘草炙

白朮

桂心各一兩

右剉散每服四錢水一盞半煎七分食前服

姜蕤湯治風溫兼療冬溫及春月中風傷寒發熱頭眩
痛咽喉乾舌強胸內疼痛滿腰背拘急

葛根

麻黃

湯泡焙乾
去節

甘草

炙

白薇

川芎

羌活

杏仁

各半兩
去皮尖

石膏

碎一兩

姜蕤

三分

青木香

一分

右剉散每服五錢水一盞半煎七分食前服青木香
冬用一兩春半兩渴加栝樓根二片

痰瘧

風證加減桂枝湯治先熱後寒煩燥自汗惡風名溫瘧

石膏

四兩半

知母

一兩半

甘草

半炙兩

桂枝

一兩

粳米

一合

右剉散每服四錢水一盞半煎七分未發前進三服

白朮散治傷風不留經絡與衛氣相併病以日作寒熱

交煎

麻黃

去節

白朮

去蘆

茯苓

桂心

各一兩

陳皮

青皮

去白

桔梗

去蘆

白芷

甘草

半夏麴

紫蘇

烏梅

各三分
去核

乾薑

半兩

右剉散每服四錢水二盞薑三片棗二枚煎七分當
發日空心一服臨發一服尤妙亦治時疫

寒證五積散治體虛作瘧先寒後熱寒則湯火不能溫
熱則冰雪不能冷惡寒無汗

方見陽寒陰證類

養正丹

見瘧
冷類

薑附湯附子理中湯

並見中
寒類

總治寒瘧

暑證香薷散治但熱不寒陰氣孤絕陽氣獨發少氣煩

冤手足熱而欲嘔兼渴

方見傷暑類

一方加黃連每料二兩名黃連香薷散治暑瘧獨熱
燥煩大渴引飲小便不利或背寒面垢每服加燈心
二十莖麥門冬去心二十粒淡竹葉七皮車前草二
根晚禾根一握檳榔一箇刀切煎不拘時候

小柴胡湯治傷暑發瘧熱多寒少或但熱不寒咳嗽煩
渴小便赤每服加生薑三片烏梅一箇麥門冬二十粒
去心地骨皮少許煎溫服不拘時候熱盛大腑不通加

大黃枳殼各一錢一服立效

方見傷寒陽證類

清脾湯治瘴癘脈來弦數但熱不寒或熱多寒少脘滿能食口苦舌乾心煩渴大小便黃赤大腑不利

青皮

去白

厚朴

去蘆皮薑汁炒

白朮

去蘆

草果仁

柴胡

去蘆

茯苓

去皮

半夏

湯洗七次

黃芩

甘草

炙各等分

或加人參亦可

右剉散每服四錢水盞半薑五片煎七分不拘時溫服

消暑丸治傷暑發瘧痰多煩悶眩暈每服五十丸淡薑

湯吞下

方見中暑類與前藥相兼多服取效

濕證術附湯治寒熱身重骨節煩疼脹滿澀澀自汗喜

嘔因汗出復浴濕舍皮膚及冒雨濕所致

除濕湯治同上

二方見中暑傷濕類除濕湯即滲濕湯

五苓散治傷濕小便不利發瘧

方見傷暑類

食證二陳湯治傷食發瘧痰多

陳皮

半夏

製各五兩

白茯苓

三兩

甘草

炙一兩

右剉散每服三錢薑五片烏梅一箇煎服寒多者加
草果熱多加前胡青皮檳榔縮砂白豆蔻之類隨意
增減

小清脾湯治胃瘧發作有時先覺伸欠乃作寒慄鼓振
頤頷中外皆寒腰背俱痛寒戰既已內外皆熱頭疼如
破渴欲飲冷或痰聚結胸中煩滿欲嘔或先熱後寒先
寒後熱寒多熱少寒少熱多或寒熱相半或但熱不寒
但寒不熱或隔日一發一日一發或三五日一發者悉

主之

厚朴

製同前
四兩

烏梅

去核

半夏

湯去滑

青皮

良薑

各二兩

草果

去皮
一兩

甘草

炙
半兩

右剉散每服四錢水二盞薑三片棗一枚煎七分去

滓未發前併三服忌生冷油膩時果此藥溫脾化痰

治胸膈痞悶心腹脹滿噫醋吞酸自可常服

紅丸子治食滯食積氣滯腹脹

京三稜

水浸軟切片

蓬莪朮

煨

青皮

去白

陳皮

去白

胡椒

乾薑

炮 各三兩

右為末米醋煮米粉糊丸梧桐子大礬紅為衣每服

五十九粒薑湯下或二陳湯下

方見前

七情四獸飲治五臟氣虛喜怒不節勞逸兼并致陰陽相勝結聚痰飲與衛氣相搏發為瘧疾

人參

去蘆

白朮

去蘆

白茯苓

去皮

甘草

橘紅

半夏

草果

去皮

烏梅

去核

紅棗

生薑

右等分剉散每用半兩以鹽少許淹少時厚皮紙裹
水濕慢火煨香熟取出用水二盞煎未發前服

痰癰枳梗半夏湯除痰下氣治胸脇脹滿寒熱嘔噦心
下堅痞短氣煩悶痰逆惡心飲食不下

桔梗

陳皮

去白
五兩

半夏

湯洗七
次五兩

枳實

炒
二兩半

右剉散每服二錢水一中盞生薑五片烏梅一箇煎
至七分溫服不拘時候

半夏丸治瘡咳嗽涎盛痞滿煩悶咽膈不利嘔吐不利

神思昏憤心忪面熱並皆治之

半夏

十六兩湯洗去滑薑汁淹一宿

白礬

八兩枯過

右為末生薑自然汁為丸梧桐子大每服三十丸至五十丸食後臨卧淡薑湯吞下

瘡癰附子湯治瘡癰經久不瘥正氣羸弱身熱如火極寒極熱連日方醒發時沈著枕簟不能擡身戰掉不堪便溺飲食俱不便

附子

二枚一枚生去皮臍鹽水浸各一兩

右劉散每服三錢水一盞半生薑七片紅棗七枚煎至七分去滓攤冷就吞靈砂丹五十粒或百粒未效再以七棗湯吞黃芽丹二十粒仍服黑錫丹以墜痰亦可回元氣凡有此瘡但當守續真元沈虛熱為法小柴胡湯治挾嵐嶂溪源蒸毒之氣自嶺以南地毒苦炎燥濕不常人多患此其狀血乘上焦病欲來時令人迷困甚則發燥狂妄亦有啞不能言者皆由敗血瘀心毒涎聚於脾所致於此藥中加大黃枳殼各五錢

方見傷寒類

地龍飲治瘴瘧諸瘧大熱煩燥

生地龍

三條研細末

右入生薑汁薄荷汁生蜜各少許新汲水調下如熱熾加腦子少許服效

觀音丸取下暑毒瘴氣毒

圓白半夏

生

烏梅肉

川巴豆

不去油

母丁香

已上各十枚蕪右為末薑汁麵糊丸如麻子大上下以厚紙蓋貼有油又再易紙每服五丸臨卧冷水下

勞瘡芎歸鱉甲散治表裏俱虛真元未復疾雖暫止小
勞復來

當歸

川芎

白茯苓

去皮

青皮

去白

陳皮

去白

半夏

湯洗七次

鱉甲

去裙醋炙黃

芍藥

各二錢半

右剉散每服三錢薑五片棗二枚烏梅一箇水煎不
以時服熱多加柴胡寒多加草果少許

瘡母消癖丸治彌年經吐汗下榮衛虧損邪氣伏藏脇
間結為癥癖腹脇堅痛

芫花炒

朱砂

研各等分

右為末煉蜜丸如小豆每服十九丸濃煎棗湯下去癖
須用芫花大戟破水之劑下後即與養胃湯

方見傷寒陰証

類

熱瘧八正散治瘧發則心煩臉赤聲叫煩燥極熱欲冷

地上臥及冷漿加牛黃燈心白竹青煎即效

方見積熱類

白虎湯治熱瘧表裏俱熱時時惡寒大渴口舌乾燥加

人參二錢

方見傷寒通治類

虛癰分利順元散治虛怯人患癰未可進常山等藥者

川烏

一兩

附子

一兩
或二兩

南星

二兩

木香

別對五
錢旋入

右除木香不見火三味各一半去皮生用即三生飲
一半炮熟即順元散合和切片每服四錢生薑十片
棗七枚水一盞煎至七分當發前一日及當發之日
早晨連進二三服以化去痰諺云無痰不成癰又半
生半熟乃能分解陰陽也

四將軍飲治癰作時仆厥撼掖不醒是中心抑鬱陰陽

交戰所致先依灸法後仍服此藥

附子

一兩

訶子

四箇

陳皮

四箇
全者

甘草

四寸

右剉散每服四錢水二盞生薑七片棗七枚煎至七分初服或不納再進則漸能嚙四服盡頓愈更不復作

七棗湯治五臟氣虛陰陽相勝作為痲瘡不問寒熱先後與夫獨作疊間日悉主之

附子

一枚炮製以鹽水浸再泡如此
凡七次至七次不浸去皮臍

右剉散水一椀生薑七片棗七枚煎至八分當發日
空心溫服仍吃棗子四五枚

理脾飲治脾臟不和瘡疾瀉利腹痛下部無力體重足
痿脚下痛飲食中滿四肢不舉此方極驗

橘皮

主用

甘草

炙

厚朴

去麁皮一兩
薑汁炒

羌活

防風

肉豆蔻

白茯苓

各二錢半

川芎

半兩

吳茱萸

一錢
去梗

右剉散每服二錢水一盞煎至八分空心食前服

菓附湯治脾寒瘧疾不愈振寒少熱面青不食或大便溏泄小便反多訶

草果仁

附子

炮去皮臍各等分

右剉散每服半兩水二盞薑七片棗一枚煎至七分溫服不拘時候

黑錫丹治冷痰作瘧

方見瘧冷類

冷附湯治瘧疾無過是痰實痞塞不通脾胃弱虛熱在上停於胸膈不得入於臟腑所以五更冷服乃使藥下

達壯脾胃去痰實除虛熱降心氣屢用屢效

附子

重九文一兩
炮去皮臍

右切作片分二服水二大盞生薑十片煎至一盞隔
夜煎下用薄綿覆盞面露一宿五更初冷服

久瘧丁香煮散患瘧經年不安黃瘦飲食減少雖有時
歇三兩日或勞力或吃少毒物相犯寒熱立至多服效

見嘔
吐類

大已寒丸治瘧久不愈每發則極寒極熱瘧退汗如雨

生薑枳實煎湯服一服不作

方見泄瀉類

橘皮煎丸治久瘧扶虛理脾胃

方見痢冷類

通治瘧疾陰陽交爭寒熱互作用藥須半生半熟半冷半熟乃收十全之功

草果平胃散治脾虛作瘧不問寒熱先後飲食不進宜服

右以生料平胃散四兩加入草果大腹皮檳榔青皮各二兩剉碎相和勻每服五錢水一盞半薑三片棗

二枚煎七分空心多服收效

人參養胃湯治寒多熱少或但寒不熱頭痛惡心胸滿
呃逆身體疼痛缺

寒面色青白不進飲食脈來弦

數每服生薑七片棗二枚多寒加炮附子

方見傷寒陰證類

小柴胡湯與養胃湯合和名加減清脾湯寒多熱少多
用養胃湯熱多寒少多用柴胡湯寒熱均則平用生薑
挑柳枝地骨皮紅棗煎多服取效

藿香正氣散治瘧徧身腫滿加草果縮砂一兩

方見傷寒陰證類

小柴胡湯與五苓散合和名柴苓湯治傷風傷暑瘧大效每服薑三片麥門冬二十粒去心地骨皮少許煎溫

服

方見傷寒熱證類
五苓散方傷暑類

柴胡桂薑湯治瘧或有寒者但寒不熱者亦治久不愈者

北柴胡

四分

桂心

一分半

黃芩

一分半

枳樓根

二分

牡蠣

擘碎炒

甘草

乾薑

各一分

右剉散每服五錢水一盞半煎八分溫服

加味二陳湯每服四錢薑五大片加旋覆花四錢煎日

四服不拘時候久瘧有效虛弱人巢附湯兼服

方見前

截瘧勝金丸治一切瘧病發作有時蓋因外邪客於臟腑生冷之物內傷脾胃或先寒後熱先熱後寒或寒多熱少或寒少熱多或但熱不寒或但寒不熱或連日不發或間日而發或發後三五日再發寒則肢體顫掉熱則舉身如火頭痛惡心煩渴引飲氣喘急口苦咽乾背脊痠疼腸鳴腹痛或痰聚胸中煩滿欲嘔並皆治之

檳榔

四兩

常山

酒浸煎
焙一斤

右為末水麪糊為丸梧桐子大每服三十丸於發前
日晚臨卧用冷酒吞下便睡不得喫熱物茶湯之類
至四更盡再用冷酒吞十五丸忌食一切熱羹湯粥
食牛間可食溫粥至晚方可食熱忌一切生冷魚腥
等物

又方川恒山二兩為末雞卵二箇取清為丸

治證服餌
一如上法

露星飲

常山一味細剉每用五錢半酒半水煎去滓於當空以薄綿封蓋挽露至天微明時取盪溫服此小嘔泄無妨

辰砂丸治瘧之為苦異於諸疾世人治之不過用常山砒霜之類發吐取涎而已雖安所損和氣多矣有人病瘧半年前入方術用之略盡皆不能效服此遂愈

辰砂

有牆壁光明者阿魏真者各一兩

右研勻和稀米糊丸如皂角子大空心濃煎人參湯

下一丸瘧之為病雖在忌醫之列但體認得所因真

的按方用藥無不切效

一方用白茯苓甘草各三錢
分三服水一盞煎臨發時頓

服自
效

又方生薑四兩連皮搗爛止用自然汁納明日當發隔夜
安排將紗片遮蓋露一宿五更初攪動澄者一上吞
吃或有痰吐任之即安或微利亦安

灸法大椎在第一椎下陷中宛宛中灸三七壯至四十
九不止或灸第三骨節亦可

大陵穴在掌後兩骨間灸三壯立效

噫噎二穴在肩膊內廉第六椎兩傍三寸其穴抱肘取之灸二七壯至一百壯止

凡灸瘡必先問其病所發之先先尋穴灸之亦可

針法於十指近甲梢針出血及看兩舌下

有紫腫紅筋亦須針去血效

痰病

順元散治暴患痰厥氣虛身微冷面淡白昏悶不知人

事

方見風科虛證類

星香飲治暴患痰厥氣盛身熱面赤

方見中風熱証類

單方治暴患痰厥不省人事

右用生清油一盞灌入喉中須臾吐出風痰立愈

眩冒

白薇湯治平居無苦疾忽如死人身不動搖默默不知人目閉不能開口噤不能言或微知人惡聞人聲但如眩冒移時方寤此由已汗過多血少氣併於血陽獨上而不下氣壅塞而不行故身如死氣過血還陰陽復通

故移時方寤名曰鬱冒亦名血厥婦人多有之

白薇

當歸

各一兩

人參

去蘆半兩

甘草

一分

右剉每服五大錢水二盞煎至一盞去渣溫服不拘時

倉公散

瓜蒂

藜蘆

礬石

煨

雄黃

各等分

右為細末少許吹入鼻中得嚏為度此藥能起死人

卒厥尸厥

追魂湯治卒厥暴死及主客忤鬼擊飛尸奄忽絕氣不覺口噤

麻黃

去節
三兩

杏仁

去皮尖二百五十箇

甘草

炙
一兩

右為剉散每服四錢水一觔半煎七分去渣灌之通治諸感忤或口噤拗口不開去齒下湯入口活不下分病人髮左右提搦肩引之藥下漸甦令服盡取效千金有桂心二兩金匱云寸脈沈大而滑沈則為實滑則為氣實氣相搏血氣入臟則死入胃則愈若卒

厥唇口青身冷為入臟即死身和汗出則愈

內鼻散治尸厥脈動而無氣氣閉不通靜而若死名卒

厥

菖蒲

去毛

為末每用二字內兩鼻中吹之令入仍以桂末安於

舌下

硫黃散治尸厥奄然死去四肢逆冷不省人事腹中氣

走如雷鳴

焰硝 半兩

硫黃 一兩

右二件細研如粉分作三服每服用好酒一大盞煎
覺焰起傾於盞內蓋候溫灌與服如人行五里又進
一服不過三服即安

又方附子七錢炮熟去皮臍為散分作二服每服用酒
三盞煎至二盞溫服

又方生薑自然汁半盞酒一觥煎令百沸灌二服却用灸
灸法頭上百會穴四十九壯兼臍下氣海丹田穴三百

壯覺身體溫煖即止

沙證

艾湯試沙證江南舊無今所在有之原其證古方不載所感如傷寒頭痛嘔惡渾身壯熱手足指末微厥或腹痛悶亂須臾能殺人先濃煎艾湯試之如吐即是

右用五月蠶退紙碎剪安碗中以碟蓋之以百沸湯泡艾碗許仍以別紙封裹縫良久乘熱飲之就臥以厚被蓋之汗出愈

又近時多有頭額上及胸前兩邊有小紅點在於皮膚者却用紙撚成條或大燈草微蘸香油於香油燈上點燒於紅點上煖爆者是又名水傷寒却用樟木煎湯服或葱頭湯汗出愈如腹痛不止又用針於兩手十指指甲梢針出血即愈

鹽湯吐法治心腹絞痛冷汗出脹悶欲絕俗謂攪腸沙今攷之此證乃名乾霍亂此亦由山嵐瘴氣或因饑飽失時陰陽暴亂而致急用鹽湯吐法此法救人不一

右用鹽半錢許以熱湯數碗泡鹽令患人盡服連致數碗不得住手方可却以雞羽埽咽喉間即時吐所吃鹽湯盡出即時愈

又法治沙證但用苧麻蘸水於頸項兩肘臂兩膝腕等處戛掠見得血凝皮膚中紅點如粟粒狀然後蓋覆衣被吃少粥湯或蔥頭湯或清油生蔥茶得汗即愈此皆使皮膚腠理開發鬆利誠不藥之良法也

又法兩足墜痛亦名水沙

可於兩顙曲腕內兩筋兩骨間刺出血愈名委中穴

時疫

十神湯治時令不正瘟疫妄行感冒發熱或欲出疹此藥不問陰陽兩感風寒並宜服之

川芎

甘草

炙

麻黃

去根

乾葛

升麻

赤芍藥

白芷

陳皮

香附子

炒

去毛

紫蘇

各四兩

右剉散每服三錢水盞半薑五片煎七分去渣熱服不以時候如發熱頭痛加連鬚葱白中滿氣實加枳

殼煎

不換金正氣散治四時傷寒瘴疫時氣頭痛肚熱腰背
拘急五勞七傷山嵐瘴氣寒熱往來五膈氣噎咳嗽痰
涎行步喘乏或霍亂吐瀉臟腑虛寒下痢赤白並宜服
之

厚朴

去皮薑汁炒

藿香

甘草

半夏

蒼朮

米泔浸

陳皮

各等分

右剉散每服三錢水一觔半生薑三片棗二枚煎八

分去渣食前稍熱服忌生冷油煎毒物不伏水土宜服之常服進飲食調脾胃一方加白茯苓

桂枝黃芩湯治風疫脈浮數而不弱頭項疼腰痛發熱惡風遞相傳染

缺

傷寒證候頃刻傳變傷寒治法繩尺謹嚴非可以輕心
視之也其間種類不一條例浩繁是固難矣至於陰極
發燥熱極發厥陰證如陽陽證如陰脚氣似乎傷寒中
暑似乎熱病與去蓄血一證上熱下冷乍關乍寒甚至

四肢發厥昏迷悶絕凡此等類尤當審思而明辨之若疑似未別體認未明姑且試探切不可妄投決病之劑方匕雖微死生係也謹之哉

傷寒篤證

搖頭直視形如烟熏心絕 唇吻反青四肢多汗肝絕
反目直視狂言遺尿腎絕 汗出發潤喘而不休肺
絕 環口鰲黑柔汗發黃脾絕 汗出如油喘促無已
水漿不下形體不仁命絕 大發濕家汗則成痙熱而

症不治 發濕溫汗身青面變耳聾不語曰重暈不治

發風溫汗必譫語並不治 發風濕中濕汗並逆

發動氣汗不治 發少陰汗九竅出血曰下厥上殞不

治 發少陽汗則譫語發汗只在頭面不至遍身鼻衄

不止者逆 發汗不至足者逆 諸逆發汗劇者言亂

目眩並不治 當汗無汗服麻黃數劑七日汗不出者

不治 汗出如珠不流不治 汗出如油口噤肉戰呻

吟喘促不治 汗後嘔吐水藥不入口者逆 熱病脈

燥盛而不得汗不治 汗後不為汗衰復大熱脈躁疾
狂言不食曰陰陽交不治 忽冒昧無脈服藥提汗解
則生若無汗脈不至者不治 少陰厥逆無脈服藥通
脈其脈漸續則生暴出則不治 下利厥逆無脈灸之
脈不回身不溫微喘不治 少陰四逆下利惡寒而拳
發躁無脈不治 下利日十餘行其脈反實者逆 少
陽陽明合病下利脈長大而弦曰負不治 陽病見陰
脈不治 發斑屬陽見陰脈不治 代脈不治 吐血

衄血脈反浮大而牢不治 陰易陽易脈離經外腎腫
腹中絞痛手足拳攣不治 欬逆上氣脈散者不治
譫語脈反沈微四肢厥冷不治 脈陰陽俱虛熱不止
者不治 七八日以上發大熱難治 舌本爛熱不止
者逆 下利發熱或汗不止厥不止並不治 下利發
熱厥逆燥不得眠不治 譫語直視或喘滿或下利並
不治 譫語屬陽見陰證者逆 傷寒脈乍疎乍數不
治 發斑先赤後黯面色黧晦不治 發斑大便秘利

不治 發黃而變黑不治 口乾舌黑不治 口張目

陷不治 張口出氣乾嘔骨骸熱痛者逆咳逆不止者

不治 心下痞悶上氣喘麓者逆 霍亂喘脹煩燥不

治 誤下溫家額汗喘促或小便不利大便自利不治

頭汗內外關格小便不利此為陽脫不治 腹滿欬

逆不得小便不治 腹大滿而下泄不治若脈洪緊而

滑尤可慮 臟結如結胸舌白胎陰筋引臍腹痛時時

下利不治 結胸證具加煩躁不治 臟厥七八日發

厥膚冷煩燥下利無時暫安不治 少陰吐利厥逆煩

燥不治

關

利反能食者曰除中不治 四肢厥


逆臍下絞痛石硬眼定者逆 厥陰脣青舌卷黑而耳

聾囊縮不治 頭連腦痛甚手足俱寒不治 陰毒陽

毒過六七日不治 兩感難治 孤感咽乾聲啞脣瘡

不治 赤斑五救其一 黑斑十救其一 尋衣摸空

者逆



世醫得效方卷二

欽定四庫全書

子部

世醫得效方卷三

詳校官太醫院醫士_臣舒佑

編修_臣倉聖脈覆勘

總校官降調編修_臣倉聖脈

校對官中書_臣李斯咏

謄錄監生_臣張增

欽定四庫全書

世醫得效方卷三

元 危亦林 撰

大方脉雜醫科

諸氣

縮砂香附湯調中快氣治心腹刺痛利三焦順臟腑

香附子

炒去毛
十兩

烏藥

去心
五兩

粉草

炒
二兩

縮砂

去殼一兩

右為末每服二錢紫蘇葉三皮鹽少許沸湯調下不拘時候大便氣秘橘皮湯下亦名寬氣湯

沉香降氣湯治陰陽壅滯氣不升降胸膈痞塞心腹脹滿喘促短氣乾噦煩滿咳嗽痰涎口中無味嗜卧減食又治胃痺留飲噫醋聞酸脇下支結常覺妨悶及中寒欬逆脾濕洞泄兩脇虛鳴臍下撮痛皆能治之患腳氣人毒氣上衝心腹堅滿肢體浮腫者尤宜服之常服開胃消痰散壅思食

香附子

炒去毛
一十兩

沉香

四錢六分
不見火

縮砂

去殼十
二兩

粉草

炒
三兩

右為末每服一錢入鹽少許沸湯點服凌旦霧露空
心服食去邪惡氣使無瘴疫

木香檳榔圓疎導三焦寬利胸膈破痰逐飲快氣消食

木香

不見火

檳榔

枳殼

麩炒

杏仁

去皮
尖麩

炒

青皮

去白
各一兩

半夏麴

皂角

去白
酥炙

郁李仁

去皮
各二兩

右為末別以皂角四兩用漿水一椀搓揉熬膏更入熟蜜少許和圓如梧桐子大每服五十圓食後生薑湯下

歸氣湯治氣不升降胸膈痞滿心腹刺痛不進飲食

沉香

木香

丁香

並不見火

白薑

炮

川練子肉

炒

肉桂

去皮不見火

陳皮

去白

當歸

甘草

炙

附子

一箇十二錢者炮去皮臍

縮砂

益智

炒各去殼

葫蘆巴

炒

白朮

舶上茴香

炒

豆蔻

麝 各一兩

右剉散每服三錢水一盞紫蘇三葉木瓜四片鹽少

許煎服

木香流氣飲調順榮衛通流血脉快利三焦安和五臟
治諸氣痞滯不通胸膈膨脹口苦咽乾嘔吐少食肩背
走注刺痛及喘急痰嗽面目虛浮四肢腫滿大便秘結
水道赤澁又治憂思太過怔忡鬱積脚氣風濕聚結腫
痛喘滿脹急不寧

陳皮

去白 一斤

青皮

去白

紫蘇

去皮梗

甘草

厚朴

去籠皮 薑汁製

香附

炒去毛 各半斤

木通

去節 四兩

大腹皮

丁皮

檳榔

肉桂

去籠皮 不見火

藿香葉

蓬莪木

煨切

草果仁

木香

不見火 各三兩

麥門冬

去心

人參

去蘆

白朮

去蘆

乾木瓜

石菖蒲

刮去

毛

赤茯苓

去黑皮

川白芷

各二兩

半夏

一兩 湯洗

七次
倍乾

右剉散每服四錢水一盞半生薑三片紅棗二枚煎

至七分去渣熱服如傷寒頭痛纔覺得疾入連根葱
白三寸煎服升降陰陽汗出立愈如臟腑自利入粳
米煎婦人血氣癥瘕入艾醋煎不拘時候

秘傳降氣湯治男子婦人上熱下虛飲食過度致傷脾
胃酒色無節耗損腎元水火交攻陰陽關隔遂使氣不
升降上熱則頭目昏眩痰實嘔逆胸膈不快咽喉乾燥
飲食無味下弱則腰腳無力大便秘澀裏急後重臍腹
冷疼若治以涼則脾氣怯弱腸鳴下利治以溫則上焦

壅熱口舌生瘡及脚氣上攻與久痢不瘥宜先服此藥却以所主藥治之氣壅耳聾泛熱咽疼亦效

五加皮

半兩酒浸半日炒黃色

枳殼

一兩湯浸去穢麤炒

柴胡

去毛蘆洗一兩

骨碎補

燎去毛剉炒半兩

地骨皮

半兩

炒黃

桔梗

半兩炒黃色

桑白皮

二兩剉炒

陳皮

一兩炒黃

色

訶子

炮取肉半兩炒

甘草

一兩炒

半夏

半兩生為末生薑自然汁為餅再碎炒

草果

去皮膜半兩淨洗炒黃

右剉散和勻以椀盛就飯甑上蒸一伏時傾出攤令

冷收之每服二錢紫蘇三葉生薑三片水一盞同煎
七分食後通口服痰欬加半夏麴心肺虛每料加人
參茯苓一兩上膈熱加北黃芩五錢下部大段虛加
少許炮附子煎如使附子多加生薑婦人血虛加當
歸一兩煎

蘇子降氣湯治中脘不快心腹脹滿陰陽壅滯氣不升
降胸膈噎塞喘促短氣乾噫煩滿欬嗽痰涎口中無味
嗜卧減食宿寒留飲停積不消脅下支結常覺妨悶專

治脚氣上衝心腹堅滿肢體浮腫有妨飲食

蘇子

淨炒

半夏

洗七次
各二兩半

甘草

炙

前胡

去蘆

厚朴

去麤皮薑汁製
各一兩

陳皮

去白
一兩

川當歸

去蘆
一兩半

肉桂

去麤皮
一兩不見火

右剉散每服二錢至三錢水一大盞生薑三片煎至

七分去渣溫服不拘時常服消痰飲散滯氣進飲食

體虛痰喘加人參一錢北五味子七粒鹽梅一箇杏

仁七粒去皮尖紅棗二枚煎虛煩加知母人參每料

各一兩

分心氣飲治男子婦人一切氣不和或因憂愁思慮或因酒色過傷或臨食憂煩或事不遂意以此不足留滯不散停於胸膈不能流暢致使心胸痞悶脇肋脹滿噎塞不通噫氣吞酸嘔噦惡心頭目昏眩四肢倦怠面色萎黃口苦舌乾飲食減少日漸羸瘦或大腸虛秘竝皆療之常服升降陰陽調順三焦消化滯氣進美飲食此方獨清而疎快常服大效

紫蘇

莖葉俱用四兩

羌活

半夏

湯洗七次

肉桂

去皮

青皮

去白

陳皮

去白

大腹皮

桑白皮

炒

木通

去皮節

芍藥

甘草

炙

赤茯苓

各二兩

右剉散每服三錢水一盞生薑三片棗二枚燈心十

莖取七分去渣溫服氣秘每服加枳殼去穰粟殼蘿

蔔子皂角子各半錢咳嗽不利加人參一錢五味子

七粒桔梗一錢氣滯腰疼加木瓜二片枳殼一錢半

水氣面目浮腫加車前子麥門冬去心甜葶子木

瓜澤瀉猪苓去皮每料各一兩又名小流氣飲

推氣圓治三焦痞塞氣不升降胸腹滿悶大便澀小便赤黃

檳榔

枳實

陳皮

黃

大黃

黑牽牛

炒
各等分

右為末生薑自然汁煮糊圓如梧子大每服三四十圓淡薑湯下

神保圓治諸氣刺痛流入背膂及脇下諸藥不能治

木香

胡椒

各一錢

全蝎

七枚

巴豆

十箇
去皮

研心

右為末湯和蒸餅圓麻子大朱砂為衣每服五粒心
膈痛柿蒂燈心湯下腹痛柿蒂煨薑湯下血痛炒薑
醋湯下肺氣甚者白礬蛤粉各三分黃丹一分同研
為末煎桑白皮糯米飲調三錢下小喘桑白皮糯米
飲下腎氣脇下痛茴香酒下

五香連翹湯治壯盛人胸膈痞塞氣不升降百藥不效

服之奏功必矣

方見瘡腫雜證類

神仙九氣湯治九氣膈氣風氣寒氣熱氣憂氣喜氣驚氣怒氣山嵐瘴氣積聚堅牢如盃心腹刺痛不能飲食時去時來發則欲死

川薑黃

甘草

香附子

各等分

右為末每服一大錢入鹽少許百沸湯點空心服立效

賺氣散治心胸痞悶腹脇虛脹飲食減少氣不宣通及

傷寒兩脇刺痛攻心

京三稜

蓬莪茂

煨熟
各五兩

白朮

三兩

木香

半兩

枳殼

去白麤炒
一兩

右剉散每服二錢水一盞生薑三片煎至六分食前
溫服用砂糖少許壓下

參附正氣散治陰陽不和臟腑虛弱頭目昏眩腹脇刺
痛嘔逆惡心飲食不進氣虛盜汗咳嗽上喘四肢厥冷
腰背酸疼脾虛泄瀉脾腎俱損精血傷竭氣短脉沉耳

乾焦黑面黃體瘦怠惰多困小便頻數小腸氣痛霍亂吐瀉及卒中風氣昏亂不常大病后羸倦弱妊娠失調理產后虛損長久服之大能補虛正氣調理氣血固腎消痰

人參

木香

白豆蔻

各二錢半

川芎

乾薑

甘草

藿香

茯苓

黃耆

當歸

去尾

丁香

桂心

陳皮

白芷

縮砂仁

青皮

各半兩去

白

白朮

附子炮

半夏麴各七

錢

右剉散每服半錢生薑五片棗二箇煎服

此方屢有奇效

破兜圓治受瘴結成氣塊腹中不能消散服之立效

華撥一兩

大黃一兩各生用

右為末入生麝香少許煉蜜為圓如梧子大每服三十圓空心冷酒下或溫冷湯下日三服

灸法凡上氣冷發腹中雷鳴轉嘔逆不食灸太衝穴

在足大指本節後二寸陷中不限壯數從痛至不痛
不痛至痛止心腹諸病堅滿煩痛憂思結氣心痛吐
下食不清灸太倉穴在心下四寸胃脘下一寸

臍下攪痛流入陰中發作無時此冷氣灸關元百壯
穴在臍下三寸及灸膏肓二穴

短氣不語灸大椎隨年壯又灸肺腧百壯臍孔中二
七壯乏氣灸第五椎下隨年壯

中氣

蘇合香圓治中氣雖不見方書所載然暴喜傷陽暴怒傷陰憂愁失意氣多厥逆往往多得此疾便覺涎壅于關緊急若作中風用藥非惟不相當多能死人昔有一婦人因憂戚中忽然氣厥牙噤涎潮里醫作中風用藥以大通利藥下之大泄數行一夕而卒可不戒之如遇此證急化蘇合香圓四五粒灌之便醒然後隨其調理無不痊愈

蘇合香油

一兩入安息香膏內

薰陸香

一兩研

青木香

剉

白朮

去蘆

丁香

白檀香

朱砂

研水飛

沉香

香附子

炒去毛

烏犀

鎔屑

華撥

安息香

別為末用无灰酒一升熬膏

麝香

研

訶黎勒

煨

龍腦

研已上各一兩

右為末入研藥勻用安息香膏并煉白蜜和劑每服
旋圓如梧子大取井花水溫冷任意下四圓老人小
兒可服一圓溫酒化服亦得並空心服之用蠟帝裏
一圓如彈子大緋絹袋盛當心帶之一切邪神不敢

近

獨香湯治中氣閉目不語四肢不收昏沉等證

南木香

不拘多少

右為末冬瓜子煎湯調下痰盛加南星為散生薑煎木附湯治中寒中氣之候四肢厥逆口噤牙關緊急痰涎壅盛如中風狀者

白朮

一兩
土蘆

綿附子

炮去皮臍薄片
一兩半

甘草

炙
二兩

右剉散每服三錢水一盞薑十片煎取八分去滓後

調蘇合香圓二粒併進二服或氣短頭暈手足厥逆
未退者可進養正丹三十粒至百粒奇效不拘時服
回陽湯治中氣脉弱大段虛怯等證

川烏

生去皮臍

附子

生去皮臍各半兩

乾薑

炮二錢

青皮

去穰一兩

益智仁

去殼一兩

右剉散每服三錢薑七片紅棗一枚煎服或入少木

香不拘時候

八味順氣散中風亦當間服此藥中氣者尤得其宜

白朮炒

白茯苓去皮 青皮去白

白芷

陳皮去白

天台烏藥 人參去蘆

各一兩 甘草炙
半兩

右剉散每服三錢水一大盞煎至七分溫服不拘時
候

諸疝

風寒證烏頭桂枝湯治風寒疝腹中痛逆冷手足不仁
身體疼痛灸刺諸藥不能療及賊風入腹攻刺五臟拘
急不得轉側發作叫呼陰縮悉主之

大烏頭

一枚實者去皮尖蜜壹大盞煎減半出湯切洗

肉桂

去分鹿皮

芍藥

各三錢三字

甘草

灸二分半

右剉散每服四錢水一盞半生薑五片大棗三箇入前煎烏頭蜜半合同煎至七分盞去渣食前服一法用附子一箇不使烏頭為蜜附湯

寒證倉卒散治寒疝入腹心腹卒痛及小腸膀胱氣痛刺脾腎氣攻攣急極痛不可忍屈伸不能腹中冷重如石白汗出

山梔子

四兩
燒半過

附子

一枚
炮

右剉散每服二錢水一盞酒半盞煎至七分入鹽一
捻溫服即愈暑證香薷散加瞿麥木通每服四錢食
鹽少許煎服

生料木香勻氣散治寒疝作痛和氣

丁香

檀香

木香

各一兩

甘草

炙
四兩

縮砂

去殼
二兩

白豆蔻仁

沉香

各一兩

藿香

去土
四兩

右剉散每服二錢水一盞半生薑三片紫蘇葉五皮

食鹽少許煎熱服不拘時候或為末炒茴香鹽酒調亦可

七情聚香飲子治七情所傷遂成七疝心腹脹痛痛引腰脇連背不可俛仰

檀香

木香

乳香

沉香

丁香

並不見火

藿香葉

去土各一兩

玄胡索

炒去皮

片子薑黃

洗

川烏

炮去皮尖

桔梗

去蘆剉炒

桂心

不見火

甘草

灸各半兩

右判散每服四錢水一盞半生薑七片紅棗一枚煎至七分去渣溫服不拘時候

熱證加味通心飲治腎與膀胱實熱小腸氣痛小腑不通

瞿麥穗

木通

去皮節

梔子

去殼

黃芩

連翹

甘草

枳殼

去穰

川練子

去核各等分

右判散每服五錢水一盞半燈心二十莖車前草五

莖同煎空心溫服

八正散治腎氣實熱脉洪數小腹外腎肛門俱熱大小
便不利作痛每服四錢燈心二十莖枳殼半斤去穰煎
食前溫服熱盛加淡竹葉二十皮

方見秘結類

虛冷五積散治體虛膀胱小腸氣作痛不可忍每服五
錢生薑三片鹽炒茱萸五粒茴香一撮葱白五寸煎空
心熱服

方見前傷寒陰證類

蟠葱散治男子婦人脾胃虛冷氣滯不行攻刺心腹痛

連胸脇膀胱小腸腎氣又婦人血氣刺痛並皆治療

蒼朮

泔浸一宿切焙

甘草

炙各四兩

延胡索

一兩半

官桂

去皮

乾薑

炮各一兩

縮砂

去殼

丁皮

檳榔

各二兩

蓬朮

煨

三稜

煨

白茯苓

去皮

青皮

去白各三兩

右剉散每服五錢水一盞半入連根葱白一莖煎至

七分空心熱服

通治荊芥散治風疝陰腎腫大荊芥穗不拘多少新瓦上焙為末每服二錢熱酒調下效

硃砂圓治諸疝作痛大效

木香

沉香

巴豆肉

全者各一兩

青皮

不去皮二兩

銅青

半兩研

硃砂

二錢半製如前研

右以二香青皮三味細剉同巴豆漫火炒令紫色為度去巴為末入青砂二味研勻蒸餅和圓如梧子大每服七圓至十圓湯吞下空心日進二三服

奪命散治小腸疝氣

玄胡索不拘多少鹽炒過入全蝎半錢為末每服一

錢溫酒調下立效

五苓散治撮聚疝氣連根葱白二寸燈心十莖鹽炒茴
香一撮川練子三箇去核煎湯調下大效傷暑濕作痛
亦效吞青木香圓亦可

方見傷暑類

青木香圓治膀胱疝氣腫痛及胸膈噎塞氣滯不行腸
中水聲嘔噦痰逆不思飲食常服寬中利膈

黑牽牛

六兩炒香
搗末三兩

補骨脂

炒香

革澄茄

檳榔

酸粟米飯裹以濕紙包
火中煨紙焦去飯各二兩

青木香

一兩

右為末入牽牛末令勻以清水拌和為圓如梧子大
每服五十圓溫熱水吞下

又法用二伯粒斑蝥七箇去頭足翅為末同於文武火
上漫炒令圓子微香以磁碟蓋銚上頓在冷處少頃
去斑蝥末取圓子每服五十圓茴香酒下

三茱圓治小腸氣痛外腎腫墜

山茱萸

去核

吳茱萸

去梗

石茱萸

去梗

各二兩

川練子

一兩用斑蝥十四个去翅
背同炒赤色去斑蝥不用

破故紙

錢炒一兩七

青皮去白

青鹽各三兩

黑牽牛

炒一兩

茴香

炒三兩

右為末醋煮麪糊圓如梧子大每服五十圓用桃仁十五箇炒酒送下或茴香酒亦可

失笑散治小腸氣痛婦人血痛欲死者

川五靈脂

蒲黃隔紙微炒

右剉散每服二錢酒半盞水半盞煎至七分食前服血痛臨熟入真米醋少許未效加玄胡索各等分

葫蘆巴圓治大人小兒小腸氣蟠腸氣奔豚氣疝氣偏
墜陰腫小腹有形如卵上下走痛不可忍者

葫蘆巴

炒八兩

茴香

去土炒六兩

吳茱萸

湯洗七次炒五兩

川練子

炒九兩

大巴戟

去心炒

川烏

炮去皮尖各三兩

右為末酒煮麩糊圓如梧子大每服十五圓空心溫
酒送下小兒五圓茴香湯吞下又方加牽牛

玄附湯治七疝心腹冷痛腸鳴氣走身寒自汗大腑滑泄

玄胡索

炒去皮

附子

炮去皮臍各一兩

木香

不見火

右判散每服四錢水一盞薑七片煎七分不拘時溫服
立效散治疝氣

川芎

川練子

青皮去白

茴香舶上者

桃仁

黑牽牛炒各一兩

右判散每服二錢無灰酒一盞煎八分溫服

金鈴圓治膀胱腫痛及治小腸氣陰囊腫毛間水出

金鈴子肉

五兩

茴香炒

馬蘭花炒

海蛤

破故紙

兔絲子

海帶各一兩

右為末加木香丁香末各二兩糊丸梧子大酒下三十圓
去鈴圓治疝氣

用茴香一斤以老生薑二斤取自然汁浸茴香一夜
約薑汁盡入茴香內以好食鹽二兩同炒赤取出焙
燥碾羅為末無灰酒煮糊圓如梧子大每日空心食
前服三十圓或五十圓溫酒米飲任下此藥專實脾
胃以其有鹽引入下部遂大治小腸疝氣服之累有
效尋常治疝氣藥多是疎導久而未有不為害者此

藥用薑汁專一發散而無疎導之害所以為妙也

三增茴香圓治腎與膀胱俱虛為邪氣搏結遂成寒疝
伏留不散臍腹撮痛陰核偏大膚囊擁腫重墜滋長有
妨行步瘙痒不止時行黃水浸成瘡瘍或長恠肉累治
不痊致令腎經閉結陰陽不通外腎腫脹冷硬如石漸
漸醜大皆由頓服熱藥內攻或因兜取以至如此此藥
溫導陽氣漸退寒邪補虛消疝煖養腎經能使復元應
小腸氣寒疝之疾久新不過三料第一料

茴香

炮上者用鹽半兩
同炒焦黃

川練子

炮去核
沙參洗到

木香

洗
各一兩

右為末水煮米粉稠糊圓如梧子大每服二十圓溫
酒鹽湯空心食前日進三服小病此一料可安纔盡
可服第二料

第二料加下項藥

革撥

一兩

檳榔

半兩

右入前藥共六味重五兩半依前法糊圓湯引圓數

服之若病久未愈便服第三料

第三料又加下項藥

白茯苓

四兩紫小實者去黑皮

黑附子

半兩炮去皮臍秤或作一兩

右通前藥共八味重十兩並依前法糊圓數服之加至三十圓新久大病不過此三料可愈小腸氣頻發及三十年者寒疝漸至拷棹大者皆可消散神效

消堅圓

牡丹皮

去骨桂心各一兩川烏炮去皮尖

桃仁

麩炒黃去皮尖
別研各五錢

右為末酒糊為圓如梧子大每服三十圓溫酒下

川練子圓治疝氣一切下部之疾悉皆治之腫痛縮小
雖多年服此藥永去根本

川練子

一斤淨肉 四兩用麩一合斑毛 四十九箇同炒麩黃色去麩斑 不用 四兩用

麩一合巴豆四十九粒同炒麩黃色去麩巴豆不用 四兩用麩一合巴戟一兩同炒麩黃色去麩

巴戟不用 四兩用鹽一兩茴香一合同炒黃色為度去鹽及茴香不用

木香

一兩
不見火

破故紙

一兩炒香為度

右為末酒糊圓如梧子大每服五十圓鹽湯下甚者
日進三兩服空心食前

海藻圓治偏墜小腸氣效

海藻

海帶 各一兩

斑蝥

二十八箇
去足

巴豆

二十八箇去
殼完全者

右斑蝥巴豆二味一處生絹袋盛用好醋一碗以瓦
銚盛四味同煮將乾去斑蝥巴豆不用只將海帶二
味細研為末以淡豆豉一百粒以煮藥餘醋畧浸蒸

研為膏和末藥為圓如梧子大每服用麝香少許硃砂三錢乳鉢細研至無聲却入麝香再研勻為衣日乾以新瓦瓶收之每初服七粒二服十粒三服十五粒若未愈再進三兩服皆用十五粒仍用鹽炒茴香細嚼酒吞下空心服忌鴨子并鮓醬動氣等物久病三五服效此藥貴新合效速若合下稍久多服為佳敷法治腎囊偏墜

牡礪

煨一兩

良薑

一兩

右為末津唾調傳大偏處須臾如火熱著痛即安

灸法治諸氣心腹痛小腸氣外腎弔痛疝氣小腹急痛
不可忍足大拇指次指下中節橫紋當中灸五壯男左
女右極妙又治疝氣偏墜

量患人口角兩角為一折斷如此則三折成三角如
△樣以一角臍心兩角在臍之下兩傍盡處是穴左
偏灸右右偏灸左二七壯若灸兩邊亦無害

治腎氣外腎腫小腸氣痛腹內虛鳴灸風市穴五七

壯灸氣海穴七壯灸臍左右各去一寸半兩穴各七

壯灸之立效後永不發名外陵穴

風市穴在膝上外廉五寸氣海穴在

臍下一寸半

腰痛

獨活寄生湯治風傷腎經腰痛如掣久不治流入腳膝
為偏枯冷痺緩弱之患及新產腰腳攣疼除風活血

獨活

二兩半

真桑寄生

无則用川續斷代

杜仲

切炒斷絲

北細辛

白芍藥

桂心

芎藭

防風

去蘆

甘草

人參

熟地黄

洗

大當歸

各二兩

右剉散每服四錢水二盞煎空心服或小續命湯加

桃仁煎氣血不和不食除地黃

五積散治寒傷腎經腰痛不可俛仰每服可加桃仁七

粒去皮尖煎疼甚或加黑牽牛少許熟炒研特效

方見傷寒

陰證
類

腎著湯治久處卑濕濕傷腎經腰重冷痛如帶五千錢

冷如水洗以熱物着痛處方少寬不渴小便自利食飲如故虛弱人加附子或用白朮芍藥官桂附子各等分為末每服二錢酒調服

方見傷濕類

薑附湯治體虛傷冷腰痛加官桂製杜仲

各五錢食前服方見中寒類

敗毒散治風熱腰痛加續斷天麻薄荷木瓜

各等分方見傷寒湯證類

舒筋散治血滯腰痛亦治閃挫

玄胡索

當歸

官桂

各一分

右為末每服二錢溫酒調下食前服或加牛膝桃仁

川續斷亦效

人參順氣散治氣滯腰痛加五加皮煎服方見風類或用

木香流氣飲立效方見氣類

小七香圓治鬱怒憂思氣滯腰疼

甘松

炒一十兩

甘草

炒十五兩

香附子

炒去毛十五兩

丁香皮

十五兩

蓬莪朮

煨乘熱碎二兩半

縮砂仁

二兩半

益智仁

炒七兩半

右為圓每服五十圓橘子一錢鹽少許煎湯空心服

或用沉香降氣湯打和勻氣散

神麴酒治閃挫腰痛

神麴一塊約如拳大燒令通赤好酒二大盞焯酒便

飲令盡仰卧少頃即安或用枳殼散

方見婦人類

或以縮砂烏沉湯木瓜鹽酒調熱服亦效

方見諸氣類

安腎圓治腎虛腰疼橘皮鹽煎湯吞如葷餅尤佳

方見虛損類

青娥圓治腎虛勞力腰疼益精助陽烏髭健脚力神效

破故紙

四兩炒香

杜仲

去麤皮切薑汁拌炒去絲八兩

右為末用胡桃肉五十箇大蒜二十箇研膏圓如梧

子大每服三十五圓鹽湯服虛極人十補湯吞服

方見虛損類

一方加川續斷桃仁去皮尖玄胡索黑牽牛炒酌量入

八味圓加鹿茸當歸木瓜續斷治房勞傷腎腰痛鹽湯

下

方見虛損類

二至圓治老人虛弱人腎氣虛損腰痛不可屈伸

鹿角

鎔二兩

麋角

鎔二兩

附子

炮去皮臍

桂心

不見火

補骨脂

炒各一兩

杜仲

去皮剉炒絲斷一兩

鹿茸

酒蒸焙
一兩

青鹽

別研半兩

右為末酒糊圓如梧子大每服七十圓空心用胡桃肉細嚼以鹽酒鹽湯任下惡熱藥去附子加肉蓯蓉一兩酒浸微炙乾用

牽牛圓治冷氣流注腰疼不能俛仰

延胡索

破故紙

炒各二兩

黑牽牛

炒二兩

右為末研煨蒜為圓如梧子大每服三十圓葱酒鹽湯任下

金匱要略卷三
越痛圓治腰痛極效亦治關腠

附子

炮半兩

黑牽牛

一兩

右為末酒糊圓如梧子大每服五十圓鹽湯食前服
熱大黃湯治打撲腰痛惡血蓄瘀痛不可忍

大黃

生薑

並切如豆
大各半兩

右同炒令焦黃以水一大盞浸一宿五更去渣頓服
天明所下如雞肝即惡物也

二效方治坐立或熟睡濕地濕入腎經外腎腫腰背曲

痛楚甚用五苓散每服二錢用坯子少許下青木香
圓三十粒數服臟腑微動腫消腰直其痛立止

又方趁痛圓治腰臂痛

五靈脂

赤芍藥

各半兩

川烏一箇

沒藥

四錢

麝香

一錢

右為末酒糊圓空心溫酒送下

導引法理腰背痛正東坐收手抱心一人於前據躡其
兩膝一人後捧其頭徐牽令偃卧頭到地三起三卧

便瘥

針灸法

腰背痛針決膝腰句畫中青赤路脉出血便瘥

腰痛不得俛仰者令患人正立以竹拄地度至臍斷
竹乃度背灸竹上頭處隨年壯灸訖藏竹勿令人知
灸腎腧穴亦可

眩暈

風證川芎散治眩暈惡風自汗或身體不仁氣上衝胸

戰搖如在舟船之上

川芎

一兩

北細辛

三分

白茯苓

一兩

白朮

一兩

粉草

半兩

桂枝

三分

右剉散每服四錢水一盞半生薑三片煎不拘時服

有痰兼服青州白圓子

方見風科通治類

感寒三五七散治陽虛眩暈頭痛惡寒耳鳴或耳聾

人參

附子

北細辛

各三錢

甘草

乾薑

山茱萸

防風

山藥

各五錢

右劉散每服四錢生薑五片棗二枚煎食前服中寒

眩暈欲倒服薑附湯

方見中寒類

傷暑消暑圓治冒暑眩暈煩悶不甦用香薷散生薑煎

吞下每服七十圓

方見中暑類

中濕芎朮散治冒雨中濕眩暈嘔吐涎沫頭重不食經久不瘥者

川芎

半夏

白朮

各一兩

甘草

半兩

右劉散每服四錢生薑五片木瓜二片不拘時候溫服

七情茯神湯治喜怒憂思悲恐驚所感臟氣不行鬱而生涎結為飲隨氣上厥伏留陽經心中忪悸四肢緩弱翕然面熱頭目眩冒如欲搖動

人參

麥門冬

去心

山藥

各二兩

前胡

熟地黄

洗酒拌炒各一兩

枳殼

去穰麩炒三分

遠志

甘草水煮去心薑汁拌炒三分

白茯苓

茯神

各一兩半

半夏

湯洗七次

黃耆

炙各一兩

甘草

半兩

右剉散每服四錢流水盪半薑五片秫米一撮煎食

前服

痰證加味二陳湯治痰暈或因冷食所傷

陳皮

半夏

白茯苓

各一兩

甘草

五錢

丁香

胡椒

各三錢

右判散每服四錢薑三片烏梅一箇同煎不拘時熱

服體虛甚者順元散

方見痰癰類

失血芎歸湯治去血過多頭重目昏眩暈不省舉頭欲

倒

大芎藭

大當歸

去尾各三兩

右判散每服三錢水一盞半煎不拘時候

下虛增損黑錫丹治陰陽不升降上熱下冷頭目眩暈
病至危篤或煖藥上僭愈甚者

黑錫丹頭

二兩

川練子

陽起石

木香

沉香

青皮

炒各半兩

肉豆蔻

茴香

官桂

去麤皮不見火

綿附

炮去皮臍

葫蘆巴

破故紙

炒各一兩

烏藥

去木剉一分

磁石

火煨醋淬七次細研水飛

右為末酒糊圓如梧子大每服五十圓加至七十圓
濃煎人參茯苓蘆朮湯空心吞下

身疼

風證烏藥順氣散又名通氣驅風湯加大川芎

方見
虛證類

寒證香葛湯發汗即效或用敗毒散

方並見傷寒
解及陽證類

濕證除濕湯五苓散

方見傷濕暑類

血滯當歸建中湯

方見腹痛類

或用舒筋散於內有延胡索活血除風理氣

方見腰
痛類

冷痰用二陳湯加辣桂生薑烏梅煎

方見核
瘧類

勞倦秦艽鱉甲散治男子婦人氣血勞傷四肢倦怠肌
體羸瘦骨節煩疼頭昏頰赤肢體枯槁面色萎黃唇焦
口乾心煩熱痰涎咳嗽腰背引痛乍起乍卧夢寐不寧
神情恍惚時有盜汗口苦無味不美飲食及治山嵐瘴
氣寒熱往來並能治之

荊芥

去梗
一兩

貝母

去心
一兩

白芷

半兩

山藥

天仙藤

前胡

去蘆各
一兩

羌活

肉桂

各半
兩

驚甲

去裙
酒炙

陳皮

去白

秦艸

去蘆
洗

甘草

炙各
一兩

右剉散每服二錢水一盞薑三片同煎至八分稍熱服不拘時酒調亦得常服養氣調血解倦怠

虛損證十補湯加半夏秦艸肉桂每服各半錢

方見
虛損類

臂痛

風證烏藥順氣散

方見風科虛證類

五靈脂散治臂脾痛

五靈脂

荊芥穗

防風

羌活

獨活

甘草節

川山甲

骨碎補

草烏

錢各五

麝

少許

右為末用溫酒調下臨睡服如渾身損痛加沒藥木香酒調空心服

寒證五積散和敗毒散加川牛膝木瓜葱白

方見傷寒陰證類

濕證活絡湯治風濕臂痛諸藥不效

白朮

薄切一兩

當歸

淨洗薄切乾秤

獨活

淨洗

羌活

淨洗去蘆切乾

甘草

炙

川芎

各半兩

右劉散每服三大錢水一盞半薑五片慢火煎至一盞去渣溫服合滓不拘時候

二方用蒼朮切炒川白芷各二兩為末每服二

錢酒
調效

七情白芥子散治臂痛外連肌肉牽引背脾時發時止此由榮衛之氣循行失度留滯經絡與正氣相搏其痛發則有似癰瘻

真白芥子

木鱉子 去穰各二兩

沒藥

桂心

木香 各半兩

右為末入研藥令勻每服一錢溫酒調下

流氣飲子 治同上

紫蘇葉

青皮

苦梗

當歸

芍藥

烏藥

茯苓

川芎

黃耆

枳殼

去穰
麩炒

防風

各半
兩

甘草

橘皮

各三分

木香

連皮大腹子

二兩剉
薑片炒

右剉散每服水二盞薑三片棗一枚煎至一盞去滓

服

痰證茯苓圓

方見痰飲類

芎活湯治水飲停蓄注於經絡發為臂痛皆因脾土有虧平日多飲水漿不能傳化所致

川芎

半夏

湯洗

白茯苓

川獨活

陳皮

枳殼

去穰炒各半兩

白朮

甘草

各一分

右為散每服三錢水一盞半生薑五片同煎去滓食後停少時溫服

控涎丹凡人忽患胸背手脚腰胯隱痛不可忍連筋骨

牽引釣痛坐卧不寧時時走易不定俗醫不曉謂之走
注便用風藥及針灸皆無益又疑風毒結聚欲為癰疽
亂以藥貼亦非也此乃是痰涎伏在心膈上下變為此
疾或令人頭痛不可舉或神意昏倦多睡飲食無味痰
唾稠粘夜間喉中如鋸聲多流睡涎手脚重脰冷痺氣
脉不通誤認為癰瘕亦非也凡有此疾但以是藥不過
數服其疾如失

甘遂

去心

紫大戟

去皮

白芥子

真者

各等分

右為末煮糊圓如梧子大曬乾食後臨睡薑湯或熟水下五七圓至十圓如疾猛氣實加圓數不妨其效如神加味控涎圓一方見喘急類

氣滯神保圓

方見諸氣類

血氣滯舒經湯治血氣滯留經絡不行臂痛不可忍者

片子薑黃

四兩如無用嫩莪朮代不可用染物者

白朮

炒二兩

羌活

甘草

炙各一兩

當歸

二兩

海桐皮

去麋皮二兩

赤芍藥

一兩

右為散每服三錢水一盞煎至七分空心服

熱證防風通聖散

方見風科熱證類

敷貼藥治臂腿間忽一兩點痛著骨不可忍

芫花根一味研為末米醋調隨大小傳之立止敷貼
不住須以紙花覆其上用絹帛扎定

針法肩隅一穴隨時而愈

脇痛

傷寒小柴胡湯加白牡蠣粉研碎枳殼去穰切片各半

錢煎

方見傷寒陽證類

氣滯神保圓治膀胱氣脇下痛或項筋痛久不愈流入

背脊臂脾並皆治之每服七粒用茴香酒下

方見諸氣類

七情枳殼煮散治悲哀煩惱傷肝氣至兩腋骨疼筋脉

拘急腰脚重滯兩股筋急兩脇牽痛四肢不能舉漸至

背脊攣急大治脇痛

防風

去蘆

川芎

細辛

枳殼

去蘆
麩炒

桔梗

炒

甘草

炒

乾葛

一兩半

各四兩

二兩

右剉散每服四錢水一盞半生薑三片煎至七分去

渣空心溫服

通治推氣散治右脇疼痛脹滿不食

甘草炒二錢

枳殼

去穢炒

桂心

去皮不見火各半兩

片子薑黃

洗半兩

右為末每服二錢薑棗湯調服酒亦可

川芎散治左脇刺痛不可忍者

枳實

川芎

各半兩

粉草

炙二錢半

右為末每服二錢薑棗湯調服酒亦可

枳殼散治脇間痛如有物以挿然及氣疾也

枳殼

去穰炒二兩半

甘草

炙七錢半

右為末每服二錢濃煎葱白湯調下不拘時侯

腹痛

風證胃風湯治腸胃不足風冷乘之水穀不化泄瀉下
注腹中虛滿日夕滾痛或下瘀血或如豆羹汁服熱藥
無效者此風痛也加入濃磨木香水一合

方見泄瀉類

寒證體虛者五積散生薑三片煨葱白二根木瓜二片

鹽炒茱萸七粒煎體實者藿香正氣散生薑三片枳殼

半片木香少許煎

方並見傷寒陰證類

暑證香薷散加生薑陳大蓼木瓜陳壁土煎五苓散以

熱蘇鹽湯調香薷散為末服亦效湯引五苓散同

方並見傷

暑類

濕證香蘇散加炒蒼朮煨枳殼煎未效用不換金正氣

散生薑木瓜紅棗車前子煎效

方見傷寒和解類及時疫類以上所加隨意增

減

熱證四順清原飲治腹痛大便秘小便赤喜飲冷以手

按之轉甚不可近病者或兩手熱痛處亦熱

方見積熱類

或用大柴胡湯

方見傷寒陽證類

或用小三黃圓八正散

方見積熱類

老人大麻仁圓

方見秘結類

冷證椒附圓治臍下極冷痛楚異常手足亦冷不任冷

水冷食面黃肌瘦按之痛稍止者

綿附

一箇十錢者胡椒一百粒

右為末姜汁糊為圓如梧子大每服五十圓薑湯或

鹽湯空心吞下

蟠葱散加茱萸木香煎亦效

方見諸疝類

氣證虛者嘉禾散木香勻氣散木香流氣飲治滿腹脹
膨痛流走不定傍衝兩脇及腰間實者分心氣飲青木

香圓熟盛大便秘三和散木香檳榔圓加大黃

方並見諸氣諸

疝類

積證香蘇散用生薑烏梅縮砂煎吞感應圖治食多噫
醋吞酸口出清水惡心腹中緊痛每服三七粒萊豆大
服後得通仍佐以三稜煎圓及紅圓子平胃散縮砂香

附湯等藥方得全安

方見脾胃諸
氣痰瘧類

神保圓治寒氣停積逾旬不愈大便虛澁小便赤急痛
甚用治中湯加縮砂仁二十粒搥碎水二盞生薑十片

煎服五粒未效再服七粒立愈

方見諸氣及
傷寒陰證類

蟲證化蟲圓治腹中有塊起以手按之不見作聚往來

痛無休止亦治心痛五更心嘈牙關強硬嘔吐涎沫或吐清水及夢中齧齒面色青黃飲食雖多不作肌膚或寒或熱沉沉嘿嘿不知病之去處其蟲不療則子母相生无有休止長一尺則害人

胡粉

炒五錢

鶴蟲

三錢

白礬

五錢

檳榔

五錢

苦楝根

五錢

右為末麪糊圓如麻子大每服十五圓溫漿入生麻油一兩點打勻下之溫米飲下亦得不拘時候其虫

細小者化為水大者自下

虛證當歸建中湯治勞傷虛羸腹痛呼吸少氣小腹拘急連腰背時自汗出不思飲食

當歸 二兩

桂心 一兩半

楊芍藥 二兩

黃耆 一兩半

右剉散每服水二盞半薑三片棗二枚同煎食前溫服

通治大抵宜通塞則為痛凡痛甚須通利臟腑乃愈隨冷熱須用巴豆大黃牽牛此最要法

小理中圓治三皖氣弱中焦積寒脾虛不磨飲食遲化
喫物頻傷胸膈滿悶脇肋痛刺嘔吐噦逆噫醋惡心腹
脹腸鳴心腹疼痛噎塞膈氣翻胃吐食飲食減少

草豆蔻

煨

京三稜

煨乘
熱碎

乾薑

炮

青皮

陳皮

淨洗
去蒂

肉桂

去
各二兩
麝皮

牽牛

炒香熟
良薑

炒各
三斤

阿魏

三兩
醋化
去沙石研

縮砂仁

紅豆

蓬莪朮

炒乘熱碎
各一斤

右為末用水煮麪糊圓如梧子大每服三十粒生薑

橘皮湯下溫湯亦得不拘時此藥無利性不損脾胃
氣偏虛寒者最宜服之與三稜煎圓和同服尤妙

方見

諸氣類

腹痛作嘔欲利大便諸藥皆吐惟蘇感圓用薑汁泡

湯吞服最妙蘇合香圓

見中氣類

感應圓

見秘結類

氣滯腹痛神保圓柿蒂燈心湯下二七圓最為捷效

方見諸氣類或肚腹作痛以磁石數斤杵為末鋪席睡其上再以磁石煎湯調小調氣散服效

諸痺

風寒濕合痺附子湯治合痺骨節疼痛皮膚不仁肌肉重著四肢緩縱腰脚酸疼

生附子

一兩

白芍藥

官桂

甘草

白茯苓

人參

半兩

白朮

三錢

右判散每服四錢水二盞生薑七片煎至六分去渣
食前服惡甜者減甘草一半兼治瘦極筋脉氣虛倦
怠偏體酸疼

烏頭湯治寒冷濕痺流於經絡攣縮不得轉側

大烏頭

細辛

川椒

甘草

秦艽

附子

官桂

白芍

各七分

川獨活

一兩三錢半

右剉散每服三錢水一盞半棗二枚同煎至八分去

滓空心食前服

理中湯治寒濕痺加附子天麻四分之一方見霍亂類

黃耆酒治風濕痺身體頑麻皮膚瘙癢筋脉攣急言語

謇澁手足不遂時覺不仁

黃耆

去蘆

防風

去蘆

官桂

不見火

天麻

草薢

白芍藥

當歸

去蘆

雲母粉

白朮

茵芋葉

木香

不見火

仙靈皮

甘草

川續斷

各一兩

右剉散以生絹袋盛以酒一斗浸之春五日夏三日
秋七日冬十日每服一盞溫煖服之不拘時候常令
酒氣相續為佳

蒼耳散治一切風濕痺四肢拘攣

蒼耳子三兩為散水一升半煎去滓分作三服或細末水糊圓如梧桐子大每服五十圓溫酒吞下

薏苡粥治久風濕痺正氣除骨中邪氣利腸胃消水腫久服輕身益氣

薏苡 一升為末以水作粥空心服

寒證麻痺五積散

方見傷寒通治類

痰飲茯苓湯治痰飲手足麻痺多睡眩冒

半夏

湯炮七次

赤茯苓

去皮

橘皮

各一兩

枳殼

去穢炒

桔梗 去蘆

甘草 炙 各半兩

右剉散每服四錢水一盞半薑七片煎至七分去渣

溫服不拘時候

血氣滯三痺湯治血氣凝滯手足拘攣療風痺氣痺等疾

川續斷

杜仲 去皮切 薑汁炒 防風

桂心

華陰細辛

人參

白茯苓

當歸

白芍藥

甘草 各一兩

秦艽

生地黃

川芎

川獨活

各半兩

黃耆

川牛膝

各兩

右剉散每服五錢水二盞薑三片棗一枚煎至一盞去渣熱服不拘時但腹稍空服

筋痺羚羊角湯治筋痺肢節束痛

羚羊角

薄桂

附子

各一兩三錢半

川芎

獨活

一兩三錢半

白芍藥

防風

各一兩

右剉散每服三大錢水一盞半生薑三片同煎至八分取清汁服日可一二服

熱證升麻湯治熱痺肌肉熱極體上如鼠走唇口反縱
皮色變兼諸風皆治

升麻

三兩

茯苓

去皮

人參

防風

犀角

鎊

羚羊角

鎊

羌活

各一兩

官桂

半兩

右剉散每服四錢水二盞生薑二片竹瀝少許同煎
至一盞不拘時溫服

諸疸

風證艾煎丸治因傷風瘀熱不解發為風疸舉身黃小

便或黃或白寒熱好卧不欲動其脉陽浮陰弱

生艾

二月採一束搗爛銅器煎如膏

大黃

蒸

黃連

炒

括樓根

凝水石

煨

苦參

甘草

葶藶

紙隔炒各等分

右為末以艾膏和得所丸如梧子大初服六七圓漸加至二十九有熱加苦參渴加括樓根小便澁加葶藶小便多加凝水石小便白加黃連大便難加大黃並倍加

麻黃酒治傷寒不解發為黃疸其脉緊以汗解之

麻黃 三兩

右用水酒五升煎至二升每服一盞溫服汗愈

春夏秋水

暑證五苓散治伏暑中熱發黃小便不利煩渴茵陳煎

湯調下一方治疸通用

方見傷暑類

茵陳湯治濕熱瘀黃小便秘澀頭汗而渴

茵陳蒿

一兩半

大黃

半兩

小紅梔子

十枚

右剉散每服三錢水煎服五苓散亦治發黃二藥夾

煎

濕證礬石滑石散治濕疸得之一身盡疼發熱面色黑黃七八日後壯熱在裏有血下如狫肝狀小腹滿者急下之身目盡黃小便不利其脉沉細

礬石

煨

滑石

各等分

右為末每服二大錢麥粥飲調下日三服食前便利如血者效或汗愈

時行梔子圓治時行病急黃及瘴瘧疫癘

茵陳

梔子

芒硝

縮砂

大黃

蒸一兩一分

杏仁

去皮尖炒各三分

甘草

豆豉

二分半湯浸軟別研

恒山

檳榔

鱉甲

醋炙各半兩

巴豆

去皮壓去油一分

右為末，錫飴為圓，如梧子大，每服三圓，飲下，吐利為效。未效，加一圓，覺體氣有異，急服之。

黃汗苦酒湯治身體洪腫發熱，自汗如蘗汁，具脉沉。

黃耆

五兩

芍藥

桂心

三兩

右剉散每服四錢苦酒三合水一盞半煎至七分去渣
不以時服初服當心煩以苦酒阻故也至六七日稍愈
桂枝加黃耆湯治黃汗身腫汗出出已輒輕久久必
身困胸中痛腰以下無汗腰臍弛痛如有物在皮中劇
者不能食煩燥小便不利

桂枝

去皮

芍藥

各三兩

甘草

二兩
炙

黃耆

五兩

右剉散每服四錢水一盞半薑五片棗三枚煎至七
分去渣溫服仍飲熱粥以助藥力覆取微汗未汗再服

黃疸茵陳散治黃疸食已即飢身體面目爪甲牙齒及
小便悉黃寒熱或身體多赤多青皆由酒食過度為風
濕所搏熱氣鬱蒸而成

茵陳

木通

梔子仁

各一兩

大黃

炒

瓜蒌

一箇

石膏

二兩

甘草

炙半兩

右剉散每服水一盞半生薑五片葱白一莖煎至八

分去滓溫服不拘時候大小便閉加枳實赤茯苓寧磨子

小半夏湯治黃疸小便色不異欲自利腹滿而喘者不

可除熱熱去必噦

半夏

右剉散每服三錢水二錢薑十片煎至七分不以時服
單方治黃疸身眼黃如金色不可使婦人雞犬見修製

東引桃根

以細如筋若鈇股者以下一握

右以水一大升煎取一小升適溫空腹頓服後三日其
黃離離如薄雨散最後瘥百日方平復身黃後可時時
飲一盞清酒則眼中易散不飲則散遲忌食麪猪魚肉

穀疸苦參圓治胃暑瘀熱氣濁食谷不消大小便不利
脹滿不下食少陽脉緊而數亦治因勞發熱熱鬱發黃

苦參

三兩

龍膽草

一兩

梔子

去皮炒
半兩

人參

三分

右為末以猪膽汁入熟蜜少許搜和圓如梧子大以
大麥煮飲下五十圓日三服不效稍加之

脾疸龍腦圓治胸中鬱熱肺熱喘嗽口臭喉腥或口甜
丈夫吐血婦人熱血崩並皆治

龍腦薄荷

五兩淨紫

真蒲黃

一兩

麥門冬

去心
二兩

阿膠

一兩

甘草

一兩

人參

一兩

川當歸

黃耆

一兩半

木通

一兩

生乾地黄

三兩

柴胡

好者半兩

右為末煉蜜圓如梧子大每服二十圓上焦食後用
熟水吞下微嚼破更好病下焦空心服小兒加減與
之此藥大有奇效不可盡述

紅圓子治穀疸腹滿眩暈怫鬱怔忡酒疸通用二陳湯

加縮砂煎湯下

方見痰瘧類

酒疸葛根湯治酒疸因下後久久為黑疸目青面黑心中如啖韭齏狀大便正黑小便亦或黑其脉微而數大抵五疸惟酒疸變證最多蓋酒之為物隨人性量不同有盈石而不醉者有濡唇而輒亂者以醞釀而成有大熱毒滲入百脉為病則不待發黃溢于皮膚為黑為腫流於清氣道中則眼黃鼻腫種種不同故方中論酒疸外有肉疸黑疸辯疸勞役疸

葛根 一兩

枳實

去穢炒

梔子仁

豉

各一兩

甘草

炙
半兩

右剉散每服四錢水盞半煎至八分去渣溫服不拘時

酒蒸黃連圓治酒疸

黃連去鬚淨四兩剉碎以酒洒醃一宿日乾為末粟
米糊為圓梧桐子大每服三四十圓以二陳湯加葛
根茵陳薑棗煎湯送下

六物飲治酒疸肚脹

華撥

荊芥穗

不蛀川練子

連皮核用

生薑母

軟烏梅

甘草

右件等分於石臼中搗細用磁器盛以自己滿腹小便去其首尾取中間小便浸藥兩重紗蓋露星一宿拂明飲其汁續用車前子山茵陳竹園萹煎湯乘熱調五苓散服自覺黃水從小便出而肚不脹妙人參散治飲酒房勞酒入百脉令人恍惚失常

人參

白芍藥

枯樓根

枳殼

麩炒去穰

茯苓

酸棗仁

甘草

炙各一兩

熟地黃

二兩

右剉散每服四大錢水一盞煎至七分食後臨卧溫服
辰砂妙香散治飲酒行房酒熱瘀於心經致成黃疸再加
辰砂末少許每服二錢茵陳二根煎湯日三服

方見心
急類

土瓜方治酒疸熱疸土瓜搗汁取服任意

如神散治酒毒不散發黃久久浸漬流入清氣道中宜
引藥內鼻滴出黃水愈

苦瓠子

去殼

苦葫蘆子

各三七箇

米

百粒

黃黍米

三百粒

安息香

二皂角子大

右為末以一字搗入鼻中滴盡黃水三升或過多則以香穰燒灰麝香末各少許搗入鼻中立止

女勞疸石膏散治女勞疸身黃額黑日晡發熱惡寒小腹急足下熱其脉浮緊腹或滿者難治

滑石

石膏 煨各等分

右為末大麥粥飲調下二錢七日三四服小便利則瘥熱疸一清飲治疸發熱諸熱通用

柴胡 三兩

赤茯苓 二兩

桑白皮 製

川芎 一兩

甘草

炙
半兩

右剉散每服三錢生薑棗子煎服

虛勞瘕秦艽飲治五瘡口淡耳鳴脚弱發寒熱小便白濁

秦艽

去蘆

當歸

去蘆
酒浸

芍藥

白朮

官桂

去皮
不見火

赤茯苓

去皮

熟地黄

酒蒸

橘紅

小草

川芎

各一兩

半夏

湯洗

甘草

炙各
半兩

右剉散每服四錢水一盞半薑五片煎至七分去渣

溫服不拘時候

養勞湯治證同上

方見虛損類

久黃苦參散治人無故忽然振寒皮膚麤塵出小便赤澁大便時秘氣無異飲食不妨諸藥湯不除因為久黃

苦參

黃連

瓜蒂

黃蘗

去皮

大黃

蒸各一分

葶藶

炒半兩

右為末每服一大錢米飲調服當吐下隨時消息加減

積黃無忌紫金圓理脾胃退黃

針砂

醋煮
通紅

紫金皮

酒浸

香附子

炒

三稜

醋浸一
宿煮

蒼朮

米泔浸

陳皮

青皮

去白

厚朴

薑制末

縮砂

各一兩

右醋糊圓每服三十圓酒熟水下川椒湯服亦可立效

五噎

五噎散治五種噎食飲不下胸背痛嘔噦不徹攻刺疼
痛淚與涎俱出

人參

茯苓

厚朴

去麁皮
薑汁製

甘草

炙

枳殼

麁炒
去穰

訶子

炮去核

桂心

白朮

橘皮

白薑

三稜

炮

神麴

炒

麥牙

炒

木香

檳榔

蓬莪朮

泡各半兩

右剉散每服二錢水一盞生薑三片梔子一枚煎至

十分空心服為末鹽湯亦得

沉香散治五噎五膈胸中久寒諸氣結聚嘔逆噎塞食飲不化結氣不消常服寬氣通噎寬中進食

白朮

茯苓

各半兩

木通

當歸

橘皮

青皮

大腹子

檳榔

芍藥

各一兩

甘草

炙
一兩半

白芷

三兩

紫蘇葉

四兩

枳殼

麩炒去穰三兩

右剉散每服水一盞薑三片棗二枚煎至六分空腹

溫服

嘉禾散治同上

大七氣湯治喜怒不節憂思兼并多生悲恐或時振驚
致臟氣不平增寒發熱心腹脹滿傍衝兩脇上塞咽喉
有如灸鬻吐噦不下皆七氣所生

半夏

湯泡七次五兩

白茯苓

四兩

厚朴

薑製炒三兩

紫蘇

二兩

右剉散每服四錢水一盞薑三片棗一枚煎空腹溫服

五膈

寬中散治因憂志寒熱動氣成五種膈氣不進飲食

白豆蔻

去皮二兩縮砂四兩

香附子

炒去毛十六兩

丁香

四兩

木香

三兩

青皮

去白四兩

甘草

炙五兩

厚朴

去皮薑汁炙令熟一斤

陳皮

去白四兩

右為末每服二錢入生薑二片鹽少許沸湯點服不以時候諸冷氣用之亦效

五膈散治五膈胸膈痞悶諸氣結聚脇肋脹滿痰逆惡心不進飲食

枳殼去穢炒

木香不見火青皮去白

大腹子

白朮

半夏麩炒丁香不見火

天南星湯泡去皮

乾薑炮

麥牙炒

草果仁各一兩甘草炙

右為末每服二錢水一中盞生薑五片煎至六分溫

服不拘時候

五膈圓治憂恚思慮膈塞不通及食冷物即發其病苦心
病不得氣息引背痛如刺心下堅大如粉絮緊痛欲
吐吐即差食飲不下甚者手足冷短氣或上氣喘急嘔
逆者

麥門冬

去心

甘草

炙

各五兩

人參

四兩

川椒

炒出汗

遠志

去心炒

細辛

去苗

桂心

各三兩

乾薑

炮二兩

附子

一兩

右為末蜜圓彈子大含化日三服夜二服胸中當熱
七日愈亦可圓如梧子大米湯下二三十圓夏加麥
門冬甘草人參各一兩一方以吳茱萸代桂治遇寒
冷則心痛咽中有物吐不出嚥不入飲食減少並可
服不拘時

寬膈圓治氣不升降胸膈結痞

木香

京三稜

青皮

各半兩

縮砂五錢

半夏

三兩湯洗七次

大腹子一分

右為末薑汁糊為圓如梧子大食後米湯下二三十

圓

瓜蒌實圓治胸中痛徹背喘急妨悶

瓜蒌實

別研

枳殼

去穰
麩炒


半夏

湯泡七次

桔梗

各一兩

右為末薑汁打糊圓如梧子大每服五十圓食後淡薑湯下



世醫得效方卷三